

Betegájékoztató: Információk a beteg számára

BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat

Hatóanyagok: orvosi ziliz gyökér száraz kivonata, hársvirág száraz kivonata, lándzsás útifű száraz kivonata

Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 5 napon belül (gyermekek esetében 3 napon belül) nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldatot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldatot tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az orvosi ziliz gyökér és a lándzsás útifű poliszacharid-tartalmuk révén enyhítik a szájüreg és a torok irritációját, ezáltal csillapítják a köhögési ingert napközben, valamint az éjszaka folyamán. A hársfavirágzat összetevői elősegítik az izzadást, így enyhítik a láz okozta fázást.

Hagyományos növényi gyógyszer, amely a megfázás korai tüneteiként fellépő száraz köhögés és éjszakai köhögés csillapítására, torokirritáció enyhítésére, illetve hőemelkedés vagy láz esetén az izzadás elősegítésére alkalmazható.

A készítmény hagyományos növényi gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló gyógyászati felhasználáson alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazandó.

A BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat felnőtteknek, serdülőknek és 4 éves kor feletti gyermekeknek ajánlott.

Keresse fel kezelőorvosát, ha tünetei 5 napon belül (gyermekek esetében 3 napon belül) nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

2. Tudnivalók a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldatot:

- ha allergiás az orvosi ziliz gyökérre, a hársfavirágzatra, a lándzsás útifűre vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészával.

Amennyiben a készítmény alkalmazása alatt a tünetek romlanak, illetve nehézlégzés, magas láz vagy gennyes köpet jelentkezik Önnél, keresse fel kezelőorvosát.

Az egyidejűleg szedett gyógyszerek felszívódása lassabbá válhat. Elővigyázatosságból a készítmény csak több mint 30 perccel – 1 órával az egyéb gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után vehető be.

Gyermekek

A készítmény alkalmazását 4 év alatti gyermekek esetében nem támasztják alá megfelelő adatok.

Egyéb gyógyszerek és a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Más gyógyszerekkel való kölcsönhatás nem ismert.

Gyógyszerkölcsönhatásokra vonatkozó vizsgálatot nem végeztek.

Terhesség és szoptatás

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészával.

A gyógyszer terhesség és szoptatás alatti biztonságosságáról nincsenek adatok. Megfelelő adatok hiányában terhesség és szoptatás alatti alkalmazása nem javasolt.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítménnyel nem végeztek a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre vonatkozó vizsgálatokat.

A BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat xilitet tartalmaz

A készítmény maximális napi adagja (60 ml) 11,04 g xilitet tartalmaz, emiatt hasmenést okozhat. A xilit kilokalória-értéke (kcal) 2,4 kcal/g.

A BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat metil-4-hidroxibenzoátot és propil-4-hidroxibenzoátot tartalmaz

Ezek a tartósítószeres allergiás reakciókat okozhatnak (amelyek esetleg csak később jelentkeznek).

A BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat propilénlikolt és benzil-alkoholt tartalmaz

A gyógyszer 13,6 g propilénlikolt és 0,002 mg benzil-alkoholt tartalmaz egyszeri adagonként (15 ml). A benzil-alkohol allergiás reakciókat okozhat.

3. Hogyan kell alkalmazni a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldatot?

A gyógyszert mindig a kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

Felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek és serdülőknek:

15 ml (a dobozban található mérőpohárral mérve) naponta legfeljebb 4 alkalommal; a maximális napi adag 60 ml. Az utolsó adag bevétele közvetlenül lefekvés előtt történjen.

Gyermekeknek 4 éves kortól a betöltött 12 éves korig:

7,5 ml (a dobozban található mérőpohárral mérve) naponta 3-4 alkalommal; a maximális napi adag 30 ml. Az utolsó adag bevétele közvetlenül lefekvés előtt történjen.

Az alkalmazás módja

Szájon át történő alkalmazásra.

A BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat hígítatlanul alkalmazandó. A bevételt követő 30 percen – 1 órán belül javasolt kerülni az ivást és/vagy evést. A csomagolásban mérőpohár található.

Az alkalmazás időtartama

Keresse fel kezelőorvosát, amennyiben a tünetek a készítmény folyamatos alkalmazása mellett romlanak vagy nem javulnak 5 napon (gyermekek esetén 3 napon) belül.

Alkalmazása gyermekeknél

4 év alatti gyermekek esetében az alkalmazás megfelelő adatok hiányában nem ajánlott.

Ha az előírtnál több BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldatot vett be
Túladagolás eseteiről nem számoltak be.

Ha elfelejtette bevenni a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldatot
Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A készítménnyel kapcsolatban nincsenek ismert mellékhatások.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az **V. függelékben található** elérhetőségeken keresztül. A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldatot tárolni?

Felbontást követően legfeljebb 25 °C-on tárolandó. Alkalmazás után az üveget tartsa jól lezárva. A fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon és a címkén feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. Felbontás után 2 hónapon belül felhasználandó.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszerével. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni felsőleges oldat?

- A készítmény hatóanyagai:
15 ml (= 16,3 g) felsőleges oldat tartalma:
 - 187,5 mg orvosi ziliz gyökér (*Althaea officinalis* L., radix) (7-9:1) kivonata (száraz kivonat).
Kivonószer: víz.
 - 136,4 mg kis- és nagylevelű hárs, közönséges hárs virágzat (*Tilia cordata* Miller, *Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia x vulgaris* Heyne, flos) (3-8:1) kivonata (száraz kivonat).
Kivonószer: víz.
 - 150,0 mg lándzsás útifű levél (*Plantago lanceolata* L., folium) (4-6:1) kivonata (száraz kivonat).
Kivonószer: víz.
- Egyéb összetevők:
maltodextrin, vízmentes koloid szilícium-dioxid, glicerin, xilit (E 967), metil-4-hidroxibenzoát (E 218), propil-4-hidroxibenzoát (E 216), citromsav-monohidrát, xantángumi, eperaroma (benzil-alkoholt (E 1519) és propilénlikolt (E 1520) tartalmaz), tisztított víz.

Milyen a BRONCHOSTOP Trio köhögés és megfázás elleni felsőleges oldat külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

A BRONCHOSTOP Trio barna színű, áttetsző folyadék. Kiöntő betéttel és garanciazáras, csavaros polietilén kupakkal ellátott barna üvegben, 120 ml-es, 200 ml-es és 240 ml-es kiszerelésben kerülhet forgalomba. Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A 2,5 ml-től 20 ml-ig beosztott mérőpohár a javasolt adagok kimérésében segít.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Bécs
Ausztria

OGYI-TN-70/01	1×120 ml	barna üveg + adagoló pohár
OGYI-TN-70/02	1×200 ml	barna üveg + adagoló pohár
OGYI-TN-70/03	1×240 ml	barna üveg + adagoló pohár

Ezt a gyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi neveken engedélyezték:

Ausztria:	BRONCHOSTOP Erkältungs- und Hustensaft
Bulgária:	Bronchostop Nite 187.5 mg / 136.4 mg / 150.0 mg oral solution
Csehország	Bronchostop Trio
Észtország:	Broncophen Nite
Horvátország:	Bronchostop Trio oralna otopina
Románia:	Bronchostop Trio pentru Tuse și Răceală soluție orală
Szlovénia:	Slez, trpotec in lipa Bronchostop peroralna raztopina
Szlovákia:	Bronchostop deň a noc perorálny roztok

A betegájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2025. október.